HOCHSCHULE
RAVENSBURG-WEINGARTEN
UNIVERSITY
OF APPLIED SCIENCES

Reduktion der Brustkrebssterblichkeit durch regelmäßiges Mammographie- Screening

Carolin Graf

Matrikelnummer: 36402

23.06.2025

Veranstaltung: Evidence based Practice

Dozentin: Dr. Andrea Jessen

Relevanz und Begründung

Brustkrebssterblichkeit

- Brustkrebs (Mammakarzinom) ist die häufigste Krebserkrankung bei Frauen
- 74.500 Neuerkrankungen jährlich (Stand 2022)
- Ca. eine von acht Frauen erkrankt im Laufe ihres Lebens an Brustkrebs
- Dabei erkrankt eine von sechs betroffenen Frauen vor dem 50. Lebensjahr
- Über 17.000 Frauen sterben jährlich an Brustkrebs

Mammographie-Screening

- Für Frauen zwischen 50 und 75 Jahren die einzige wirksame Methode zur Brustkrebsfrüherkennung
- Röntgenuntersuchung der weiblichen Brust
- Erfolgt alle zwei Jahre

Mammographie in Zahlen

Von 1.000 Frauen, die sich im Mammographie-Screening untersuchen lassen, erhalten:

970 Frauen einen unauffälligen Befund

30 Frauen einen auffälligen Befund

11 Frauen eine minimal-invasive Gewebeentnahme (Biopsie)

6 Frauen die Diagnose Brustkrebs

Literatur-Auswahlkriterien

Einbeziehung

- Meta-Analysen, Randomisierte Kontrollierte Studien, systematische Reviews
- Peer-reviewed
- Studien mit direktem Bezug zur gesuchten Population
- Sprache: Deutsch, Englisch

Ausschluss

- Nicht verfügbare Volltexte
- Kinder und Jugendliche
- Studien ohne Bezug zur gesuchten Population

Filter

- Erscheinungsdatum in den letzten 5 Jahren

PICO-Schema

Führt die Durchführung eines zweijährlichen Mammographie-Screenings bei Frauen ab 40 Jahren im Vergleich zu einem Screeningbeginn ab 50 Jahren zu einer Reduktion der Brustkrebssterblichkeit?

P – Population	Frauen im Alter von 40 bis 49 Jahren
I – Intervention	Teilnahme am zweijährliche Mammographie-Screening
C – Control	Screeningbeginn bei Frauen ab 50 Jahren
O – Outcome	Reduktion der Brustkrebssterblichkeit

Suchbegriffe

P – Population	Frauen ab 40 Jahren, Frauen 40–49 Jahre, women aged 40–49, middle-aged women
I – Intervention	Mammographie-Screening, Mammografie alle zwei Jahre, biennial mammography screening, early screening, screening from age 40
C – Control	Screening ab 50 Jahren, später Screeningbeginn, screening from age 50, standard screening, routine screening age
O – Outcome	Brustkrebssterblichkeit, Sterblichkeit durch Brustkrebs, breast cancer mortality, breast cancer death rate, reduction in mortality

Datenbanken

Literaturauswahl - CRAAP

Currency (Aktualität)	Relevance (Bezug)	Authority (Reputation)	Accuracy (Sorgfalt)	Purpose (Zweck)
<ul style="list-style-type: none"> • Studie von 2020 • ≤ 5 Jahre 	<ul style="list-style-type: none"> • Population: Frauen im Alter von 40-48 Jahre • Outcome: Auswirkungen des Mammographie-Screenings auf Brustkrebssterblichkeit • Kontrollgruppe: Screeningbeginn ab 50 Jahren 	<ul style="list-style-type: none"> • Erfahrenes Forschungsteam (13 Autoren) • Angaben über Zugehörigkeit (Affiliation) 	<ul style="list-style-type: none"> • Veröffentlichung in hochrangigem Journal • Registrierung im ISRCTN-Studienregister • Referenzen sind angegeben • Peer-reviewed 	<ul style="list-style-type: none"> • Klares wissenschaftliches Ziel: Effekt des frühen Mammographie-Screenings auf die Mortalität ermitteln • Keine Hinweise auf Interessenskonflikte oder finanzielle Interessen

Ausgewählte Studie

Randomized Controlled Trial > Lancet Oncol. 2020 Sep;21(9):1165-1172.

doi: 10.1016/S1470-2045(20)30398-3. Epub 2020 Aug 12.

Effect of mammographic screening from age 40 years on breast cancer mortality (UK Age trial): final results of a randomised, controlled trial

Stephen W Duffy¹, Daniel Vulkan², Howard Cuckle³, Dharmishta Parmar², Shama Sheikh⁴, Robert A Smith⁵, Andrew Evans⁶, Oleg Blyuss⁷, Louise Johns⁴, Ian O Ellis⁸, Jonathan Myles², Peter D Sasieni⁴, Sue M Moss²

➤ CASP Tool: 8/13 YES

Ausgewählte Studie

Titel: „Effect of mammographic screening from age 40 years on breast cancer mortality (UK Age Trial): final results of a randomized, controlled trial“

Hintergrund: Die optimale Altersgrenze für den Beginn des Mammographie-Screenings ist umstritten. Ziel der Studie war es, zu untersuchen, ob ein Screeningbeginn bereits mit 40 Jahren die Brustkrebssterblichkeit senkt.

Studiendesign: RCT (randomisierte kontrollierte Studie)

- Teilnehmerinnen: 160.921 Frauen im Alter von 39–41 Jahren in Großbritannien
- Zeitraum: Rekrutierung 1990–1997, Nachbeobachtung bis 2017
- Intervention: Jährliche Mammographie bis zum Alter von 48 Jahren
- Kontrollgruppe: Kein Screening bis zum regulären Einstieg mit ca. 50 Jahren
- Analyse: Intention-to-Treat, medianes Follow-up: 22,8 Jahre

Ausgewählte Studie

Ergebnisse:

Nach 10 Jahren:

Signifikante Senkung der Brustkrebssterblichkeit:

RR = 0,75 (25 % Risikoreduktion)

83 Todesfälle (Interventionsgruppe) vs. 219 (Kontrollgruppe)

Nach >10 Jahren:

Kein signifikanter Unterschied mehr: RR = 0,98

Bewertung der Studie

Stärken	Schwächen
Peer-reviewed	Abweichung: Intervention bestand aus jährlichem anstatt zweijährlichem Screening
RCT – Goldstandard der klinischen Forschung	Keine Verblindung von Patientinnen/ Ärzten/ Auswertern
Große Fallzahl (über 160.000 Teilnehmerinnen)	Unerwünschte Effekte wie Überdiagnosen, falsch-positive Befunde, Psychische Belastung, Kosten werden nicht berücksichtigt
Medianes Follow-up: 22,8 Jahre	Langfristiger Effekt nicht signifikant, deshalb Nutzen möglicherweise auf Zeitraum begrenzt
Bewertung kurzfristiger als auch langfristiger Effekte möglich	Andere Patientenrelevante Endpunkte wie Lebensqualität, Therapiebelastung wurden nicht berücksichtigt
Intention-to-Treat-Analyse	
Ergebnisse lassen sich gut übertragen	

Fazit

Ergebnis der Frage:

- jährliches Mammographie-Screening ab 40 Jahren führt in den ersten 10 Jahren zu einer signifikanten Senkung der Brustkrebssterblichkeit
- Wirkung nahm im späteren Verlauf jedoch ab
- methodischer Stärken wie großer Stichprobenumfang, lange Nachbeobachtung
- aber: relevante Aspekte wie Überdiagnosen und psychosoziale Folgen nicht berücksichtigt

Literaturrecherche:

- wenige aktuelle Studien zu der Fragestellung
- viele Studien zum Thema Brustkrebs, allerdings wenige mit der gesuchten Population

Literaturverzeichnis

Critical Appraisal Skills Programme (2025): CASP Checklist: CASP Randomised Controlled Trial Checklist, URL: <https://casp-uk.net/casp-tools-checklists/randomised-controlled-trial-rct-checklist/> [Stand: 17.06.2025].

Duffy, S. et al. (2020): Effect of mammographic screening from age 40 years on breast cancer mortality (UK Age trial): final results of a randomised, controlled trial, *The Lancet Oncology*, 21(9), :1165-1172. doi: 10.1016/S1470-2045(20)30398-3 [Stand: 17.06.2025].

Kooperationsgemeinschaft Mammographie (2025): Fakten zum Mammographie-Screening, URL: <https://www.mammo-programm.de/de/neuigkeiten> [Stand: 17.06.2025].

Robert Koch-Institut (2025): Brustkrebs (Mammakarzinom), URL: https://www.krebsdaten.de/Krebs/DE/Content/Krebsarten/Brustkrebs/brustkrebs_node.html [Stand: 18.06.2025].

CASP Tool

For Randomised Controlled Trials (RCTs)

Section A is the basic study design valid for a randomised controlled trial?	
1. Did the study address a clearly formulated research question?	☒ Yes ☐ No ☐ Can't Tell
<p>CONSIDER:</p> <p>Was the study designed to assess the outcomes of an intervention? Is the research question 'formulated' in terms of:</p> <ul style="list-style-type: none"> Population studied Intervention given Comparator chosen Outcomes measured? 	
2. Was the assignment of participants to interventions randomised?	☒ Yes ☐ No ☐ Can't Tell
<p>CONSIDER:</p> <ul style="list-style-type: none"> How was randomisation carried out? Was the method appropriate? Was randomisation sufficient to eliminate systematic bias? Was the allocation sequence concealed from investigators and participants? 	
3. Were all participants who entered the study accounted for at its conclusion?	☒ Yes ☐ No ☐ Can't Tell
<p>CONSIDER:</p> <ul style="list-style-type: none"> Were losses to follow-up and exclusions after randomisation accounted for? Were participants analysed in the study groups to which they were randomised (intention-to-treat analysis)? Was the study stopped early? If so, what was the reason? 	
Section B Was the study methodologically sound?	
4. (a) Were the participants 'blind' to intervention they were given?	☐ Yes ☒ No ☐ Can't Tell

(b) Were the investigators 'blind' to the intervention they were giving to participants?	☐ Yes ☒ No ☐ Can't Tell
(c) Were the people assessing/analysing outcome/s 'blinded'?	☐ Yes ☐ No ☒ Can't Tell
5. Were the study groups similar at the start of the randomised controlled trial?	☒ Yes ☐ No ☐ Can't Tell
<p>CONSIDER:</p> <ul style="list-style-type: none"> Were the baseline characteristics of each study group (e.g. age, sex, socio-economic group) clearly set out? Were there any differences between the study groups that could affect the outcome/s? 	
6. Apart from the experimental intervention, did each study group receive the same level of care (that is, were they treated equally)?	☒ Yes ☐ No ☐ Can't Tell
<p>CONSIDER:</p> <ul style="list-style-type: none"> Was there a clearly defined study protocol? If any additional interventions were given (e.g. tests or treatments), were they similar between the study groups? Were the follow-up intervals the same for each study group? 	
Section C: What are the results?	
7. Were the effects of intervention reported comprehensively?	☒ Yes ☐ No ☐ Can't Tell
<p>CONSIDER:</p> <ul style="list-style-type: none"> Was a power calculation undertaken? What outcomes were measured, and were they clearly specified? 	

CASP Tool

For Randomised Controlled Trials (RCTs)

<ul style="list-style-type: none"> How were the results expressed? For binary outcomes, were relative and absolute effects reported? Were the results reported for each outcome in each study group at each follow-up interval? Was there any missing or incomplete data? Was there differential drop-out between the study groups that could affect the results? Were potential sources of bias identified? Which statistical tests were used? Were p values reported? 	
8. Was the precision of the estimate of the intervention or treatment effect reported?	☒ Yes ☐ No ☐ Can't Tell
CONSIDER: <ul style="list-style-type: none"> Were confidence intervals (CIs) reported? 	
9. Do the benefits of the experimental intervention outweigh the harms and costs?	☐ Yes ☐ No ☒ Can't Tell
CONSIDER: <ul style="list-style-type: none"> What was the size of the intervention or treatment effect? Were harms or unintended effects reported for each study group? Was a cost-effectiveness analysis undertaken? (Cost-effectiveness analysis allows a comparison to be made between different interventions used in the care of the same condition or problem.) 	
Section D: Will the results help locally?	
10. Can the results be applied to your local population/in your context?	☒ Yes ☐ No ☐ Can't Tell
CONSIDER: <ul style="list-style-type: none"> Are the study participants similar to the people in your care? Would any differences between your population and the study participants alter the outcomes reported in the study? Are the outcomes important to your population? 	

<ul style="list-style-type: none"> Are there any outcomes you would have wanted information on that have not been studied or reported? Are there any limitations of the study that would affect your decision? 	
11. Would the experimental intervention provide greater value to the people in your care than any of the existing interventions?	☐ Yes ☐ No ☒ Can't Tell
CONSIDER: <ul style="list-style-type: none"> What resources are needed to introduce this intervention taking into account time, finances, and skills development or training needs? Are you able to disinvest resources in one or more existing interventions in order to be able to re-invest in the new intervention? 	